

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
10. Juni 2004 (10.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/048556 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C12N 5/06,
C12P 21/02, 21/08

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003693

(22) Internationales Anmeldedatum:
7. November 2003 (07.11.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 55 508.7 27. November 2002 (27.11.2002) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH
[DE/DE]; Wilhelm-Johnen-Strasse, 52425 Jülich (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LINK, Thomas

[DE/DE]; Weststr. 33a, 52441 Linnich (DE). ESSERS,
Ruth [DE/DE]; Schönauer Friede 152, 52072 Aachen
(DE). ZÖRNER, Kerstin [DE/DE]; Im Kromsfeld 28,
51789 Lindlar (DE). GÄTGENS, Jochen [DE/DE];
Elsenkamp 39, 52428 Jülich (DE). NOLL, Thomas
[DE/DE]; Kopernikusstrasse 16, 52428 Jülich (DE).
WANDREY, Christian [DE/DE]; Wolfshovener Str. 139,
52428 Jülich (DE).(74) Gemeinsamer Vertreter: FORSCHUNGSZENTRUM
JÜLICH GMBH; Fachbereich Patente, 52425 Jülich
(DE).


(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR CULTURING CELLS IN ORDER TO PRODUCE SUBSTANCES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR KULTIVIERUNG VON ZELLEN ZUR PRODUKTION VON SUBSTANZEN



A... PROCESS TIME [h]

(57) **Abstract:** The invention relates to a method for culturing cells in order to produce substances. According to the invention, the culturing of a cell line that produces substances ensues while supplying a nutrient medium in such a manner whereby setting a glucose limitation in the culture solution. The extent of glucose limitation DGL equals $q_{Glc}/q_{Glc_{max}}$ (q_{Glc} = currently observed specific glucose consumption rate; $q_{Glc_{max}}$ equals a specific glucose consumption rate maximally known for these cells). DGL lies between the limits of 0 and 1, whereby 0 represents a complete limitation and 1 represents no limitation whatsoever i.e. a complete surplus of glucose. According to the invention, the DLG is greater than or equal to the DLG that leads to the exclusive preservation of the cell and is ≥ 0.5 .

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kultivierung von Zellen zur Produktion von Substanzen. Erfindungsgemäß erfolgt die Kultivierung einer Substanzen produzierenden Zelllinie unter Zufuhr eines Nährmediums in der Weise, daß sich in der Kulturlösung eine Glukoselimitierung einstellt. Der Grad der Glukoselimitierung $DGL = q_{Glc}/q_{Glc_{max}}$ (q_{Glc} = momentane beobachtete spezifische Glukoseverbrauchsrate; $q_{Glc_{max}}$ = maximal für diese Zellen bekannten spezifischen Glukoseverbrauchsrate). DGL liegt in den Grenzen zwischen 0 und 1, wobei 0 völlige Limitierung bedeutet und 1 bedeutet keinerlei Limitierung, bzw. völliger Glukoseüberschuß. Erfindungsgemäß ist der DLG größer gleich dem DLG, welcher zur ausschließlichen Erhaltung der Zelle führt und $\geq 0,5$.

**Veröffentlicht:**

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

B e s c h r e i b u n g

Verfahren zur Kultivierung von Zellen zur
Produktion von Substanzen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kultivierung von Zellen zur Produktion von Substanzen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

5 Bei der Produktion von Substanzen, insbesondere Proteinen, werden Zellkulturen in fermentativen Prozessen eingesetzt. Es können dabei Prozesse unterschieden werden, bei denen die Zellkulturen genetisch unverändert sind und eigene Stoffwechselprodukte bilden und bei de-
10 nen die Organismen genetisch so modifiziert sind, daß sie entweder eigene Substanzen, beispielsweise Proteine, vermehrt, oder fremde Substanzen beispielsweise Proteine produzieren. Die die Substanzen produzierenden Organismen werden dabei mit einem Nährmedium versorgt,
15 welches das Überleben der Organismen garantiert und die Produktion der gewünschten Zielverbindung ermöglicht. Für diese Zwecke sind eine Vielzahl von Kulturmedien bekannt, die eine Fermentation ermöglichen. Einer der wichtigsten Bestandteile der Kulturmedien ist die Glu-
20 kose. Nach dem Stand der Technik ist man regelmäßig bemüht in einem Fermentationsansatz eine Mindestkonzentration an Glukose aufrecht zu erhalten, um die Ausbeute an Zielverbindung zu optimieren. Die japanische Patentanmeldung 001 101 882 A offenbart ein Kultivierungsverfahren für Säugetierzellen bei dem eine Mindestkonzent-
25 ration von 0,2 mmol/l an Glukose aufrechterhalten wird. Die US 544 39 68 offenbart ein Kultivierungsverfahren,

bei dem eine Glukoselimitierung erfolgt. Das Verfahren führt jedoch nicht zu einer höheren spezifischen Produktionsrate der Zellen gegenüber der nicht limitierenden Fütterung.

5

Es ist die Aufgabe der Erfindung ein Verfahren zur Kultivierung von Zellen zu schaffen mit dem die Produktivität einer einzelnen Zelle an Produkt gesteigert wird und bei dem hohe Zelldichten ermöglicht werden. Es soll eine hohe Raum-/Zeit-Ausbeute an Produkt ermöglicht werden.

10

Das Verfahren soll besonders einfach in der Durchführung, mit minimalem Meß- und Regelaufwand verbunden, und besonders wirtschaftlich sein.

15

Ausgehend vom Oberbegriff des Anspruchs 1 wird die Aufgabe überraschenderweise dadurch gelöst, daß die Kultivierung einer, Substanzen produzierende, Zelllinie unter Zufuhr eines Nährmediums in der Weise erfolgt, daß sich in der Kulturlösung eine Glukoselimitierung einstellt. Der Grad der Glukoselimitierung kann definiert werden, als das Verhältnis der beobachteten spezifischen Glukoseverbrauchsrate zur maximal für diese Zellen bekannte spezifische Glukoseverbrauchsrate. Der Grad der Glukoselimitierung $DGL = q_{Glc}/q_{Glc_{max}}$ (q_{Glc} = momentane beobachtete, spezifische Glukoseverbrauchsrate; $q_{Glc_{max}}$ = maximal für diese Zellen bekannten spezifischen Glukoseverbrauchsrate). DGL liegt in den Grenzen zwischen $DGL_{Erhaltung}$ und 1, wobei $DGL_{Erhaltung}$ völlige Wachstumslimitierung bedeutet und 1 bedeutet keinerlei Limitierung bzw. völliger Glukoseüberschuß.

20

25

30

Zusammen mit der Glukoselimitierung erfolgt ein kontinuierlicher Rückgang der Restglukosekonzentration auf eine stationäre Konzentration in der Kulturlösung, die größer 0 mmol/l, jedoch kleiner als 1 mmol/l, bevorzugt kleiner als 0,5 mmol/l ist. Es ist zu beobachten, daß mit Sinken des DGL ein weiterer Anstieg der Lebendzell-
dichte im Kulturgefäß erfolgen kann. Mit zunehmender Glukoselimitierung konvergiert die Zelldichte dann gegen einen Maximalwert. Daraus resultiert, daß der Grad der Glukoselimitierung gegen einen minimalen Wert konvergiert, dabei ist der DGL erfindungsgemäß größer oder gleich dem DGL, welcher zur Erhaltung der Zelle führt, (maintenance Stoffwechsel)

$DGL_{\text{Erhaltung}} = qGlc_{\text{Erhaltung}} / qGlc_{\text{max}}$ ($qGlc_{\text{Erhaltung}}$ = bei reinem Erhaltungsstoffwechsel beobachtete spezifische Glukoseverbrauchsrate; $qGlc_{\text{max}}$ = maximal für diese Zellen bekannten spezifischen Glukoseverbrauchsrate), und kleiner 0,5, vorzugsweise kleiner 0,4, besonders bevorzugt kleiner 0,3.

Charakteristisch ist jedoch, daß mit der Abnahme der Glukosekonzentration keine Abnahme der Zellkonzentration in der Lösung erfolgt. Mit zunehmender Glukoselimitierung, also bei sinkendem DGL-Wert, erhöht sich die spezifische Produktivität einer Zelle. Da die Lebendzell-
dichte im Kulturgefäß nicht absinkt, führt dies zu einer Erhöhung der Raum-Zeit Ausbeute. Mit Eintreten der Glukoselimitierung geht phänomenologisch eine Erniedrigung der spezifischen Laktatbildungsrate einher. Die Laktatbildungsrate konvergiert gegen einen Minimalwert. Dies führt dazu, daß die Restlaktatkonzentration im Kulturgefäß absinkt, maximal gegen 0 geht. Mit der

Glukoselimitierung kommt es also zu einer Umstellung des Zellmetabolismus.

Wichtig ist dabei, daß es vor Einsetzen der Glukoselimitierung zu keiner weiteren Limitierung durch andere Substrate kommt. Daher muß das Wachstumsmedium so beschaffen sein, daß Glukose zuerst limitiert ist.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird die Raum-/Zeit-Ausbeute bei gegebener Zelldichte erhöht. Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird die pro Zelle zur Verfügung stehende Menge an Glukose derart vermindert, daß die Glukose überwiegend in den Erhaltungsstoffwechsel und verbunden damit das Produkt und weniger in Zellwachstum eingeht. Das erfindungsgemäße Verfahren bedarf dabei nicht einer Regelung der Glukosezufütterung, so daß das Verfahren besonders einfach ist, da auf eine aufwendige Glukoseregulierung verzichtet werden kann. Dadurch, daß ein geringer Medienzufluß nötig ist, werden Kosten für Glukose gespart, da weniger Glukose benötigt wird. Zudem wird eine sehr hohe Produktkonzentration erreicht. Dies kann zur Senkung der Aufarbeitungskosten führen. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht insbesondere die Steigerung der Produktion von Proteinen, ohne daß eine Zelllinie für die Umsetzung des erfindungsgemäßen Verfahrens zusätzlich genetisch verändert werden muß. Die Erhöhung des Produkttiters ermöglicht die Produktion einer gewünschten Menge an Produkten in einem kleineren Kultivierungsvolumen, was zu geringeren Investitionskosten führt.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann mit folgenden Verfahrensschritten durchgeführt werden:

Die Zellen sollen vorzugsweise in kontinuierlicher Verfahrensweise mit Zellrückhaltung, z. B. Spinfilter (Perfusionskultur) kultiviert werden. Dabei sind alle gängigen Arten von Kulturgefäßen, wie zum Beispiel

5 Rührkessel, und Zellrückhaltemechanismen, wie beispielsweise Spinfilter, Ultraschall oder Settler geeignet. Vorzugsweise sollte das Kultursystem hohe Zelldichten ermöglichen. Vorzugsweise wird eine Zellrückhaltung realisiert, damit die Zelldichte bei Auftreten

10 der Glukoselimitierung nicht absinken kann. Dies führt dazu, daß bei steigender Lebendzelldichte und gleichbleibender Glukosezufütterung, der DGL weiter verringert wird. Die hohe Zelldichte ermöglicht ein Absinken des DGL unter einen Wert von 0,4 bei einer eingestellten

15 Durchflußrate in einer Größenordnung der maximalen Wachstumsrate. So können beispielhaft Durchflußraten von 0,03 - 0,05 h⁻¹ für die verwendete CHO MUC2-GFP-C-term Zelle, sowie die verwendete CHO/MUC1-IgG2a PH3744/25 Zelle angewendet werden.

20 Um eine Verringerung des DGL zu erreichen, kann die Fütterungsstrategie mit Glukose demnach wie folgt erfolgen: Die Menge an zugefütterter Glukose wird nicht mit zunehmender Lebendzelldichte erhöht, um eine Glukoselimitierung zu vermeiden. Vielmehr wird die Menge an

25 zugefütterter Glukose während des Prozesses von Beginn an konstant gehalten. Dabei sollte die Menge an zugefütterter Glukose so gewählt sein, daß der DGL die erforderlichen Werte unterschreitet, nämlich DGL kleiner

30 ≤ 0,5, vorzugsweise ≤ 0,4, besonders bevorzugt ≤ 0,3. Daraus resultiert, daß die Menge zugefütterter Glukose vorzugsweise nicht größer als 50 %, besonders bevorzugt nicht größer als 35 % dessen ist, was die im System bei

herkömmlicher, nicht glukoselimitierter Prozeßführung zu erwartende Lebendzellzahl maximal verbrauchen kann. Nach Umstellung des Zellmetabolismus (Laktatstoffwechsel und Produktivität) kann die Menge zugeführter Glukose langsam erhöht werden, sollte dabei jedoch nicht einen DGL von größer als 0,5, vorzugsweise größer als 0,4 ermöglichen. Dies führt zu einer weiteren Erhöhung der Lebendzelldichte bei gleichbleibend hoher Produktivität und damit erhöhter Raum-/Zeit-Ausbeute. Die Menge zugeführter Glukose kann in einem kontinuierlichen Prozeß durch die Medienzufußrate und die Glukosekonzentration im Zufütterungsmedium beeinflußt werden. Maßgeblich ist, daß der Massenfluß an zugeführter Glukose während des Prozesses nicht oder nur in solchem Maße erhöht wird, daß der DGL einen Wert von kleiner 0,5, vorzugsweise kleiner 0,4 erreicht oder unterschreitet und dieser dann nicht mehr überschritten wird.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Im Folgenden soll die Erfindung in ihren Einzelheiten dargestellt werden.

Die Figuren zeigen beispielhafte Versuchsergebnisse.

Es zeigt:

Fig.1: Zunahme der vitalen Zellzahl [ml^{-1}] und Darstellung der Mediendurchflußrate [h^{-1}] gegen die Prozeßzeit [h] für die Produktion von MUC1-IgG2a aus CHO MUC1/IgG2a PH3744/25 Zellen im Perfusionsreaktor.

Fig.2: Spezifische Produktivität an MUC1-IgG2a [$\mu\text{g}/\text{h} \cdot \text{E9 Zellen}$] und DGL gegen die Prozeßzeit im Perfusionsreaktor.

Fig.3: Zunahme der vitalen Zellzahl [ml^{-1}] und mM Restglukose, aufgetragen gegen die Prozeßzeit [h] für die Produktion von MUC1-IgG2a aus CHO MUC1/IgG2a PH3744/25 Zellen im Perfusionsreaktor.

Fig.4: Glukose- und Laktatkonzentration sowie Konzentration von Glukose im Medienzu-
lauf [mmol/l], aufgetragen gegen die Prozeßzeit [h] für die Produktion von MUC1-IgG2a aus CHO MUC1/IgG2a PH3744/25 Zellen im Perfusionsreaktor.

Fig.5: Zunahme der Konzentration an MUC1-IgG2a [$\mu\text{g}/\text{ml}$] und $q\text{MUC1-IgG2a}$ [$\mu\text{g}/\text{h} \cdot \text{E9 Zellen}$] gegen die Zeit [h] für die Produktion von MUC1-IgG2a aus CHO MUC1/IgG2a PH3744/25 Zellen im Perfusionsreaktor.

Fig.6: Zunahme der vitalen Zellzahl [ml^{-1}] und Darstellung der Mediendurchflußrate [h^{-1}] gegen die Prozeßzeit [h] für die Produktion von MUC2-GFP-C-term aus CHO MUC2-GFP-C-term Zellen im Perfusionsreaktor.

Fig.7: Spezifische Produktivität an MUC2-GFP-C-term [nmol/h*E9 Zellen)] und DGL gegen die Prozeßzeit im Perfusionsreaktor.

5

Fig.8: Zunahme der vitalen Zellzahl [ml⁻¹] und Restglukose [mM], aufgetragen gegen die Prozeßzeit [h] für die Produktion von MUC2-GFP-C-term aus CHO MUC2-GFP-C-term Zellen im Perfusionsreaktor

10

Fig.9: Glukose- und Laktatkonzentration sowie Konzentration von Glukose im Medienzu-
lauf [mmol/l], aufgetragen gegen die Prozeßzeit [h] für die Produktion von MUC2-GFP-C-term aus CHO MUC2-GFP-C-term Zellen im Perfusionsreaktor

15

Fig.10 Zunahme der Konzentration an MUC2-GFP-C-term [nM] und qMUC2-GFP-C-term [nmol/h*E9 Zellen)] gegen die Zeit [h] für die Produktion von MUC2-GFP-C-term aus CHO MUC2-GFP-C-term Zellen im Perfusionsreaktor.

20

25

Weiterhin zeigt Tabelle 1 die Versuchsdaten aus der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens mit der CHO MUC1/IgG2a PH 3744/25 Zelle.

In Tabelle 2 sind die Versuchsdaten aus der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens mit der CHO MUC2-GFP-C-term Zelle dargestellt.

5 Die erfindungsgemäße Verfahrensweise kann mit verschiedenen Produktionszelllinien durchgeführt werden. Die Zelllinien können als Wildtyp oder als genetisch modifizierte, rekombinante Zellen eingesetzt werden. Die genetische Modifikation kann beispielsweise durch Insertion von zusätzlichen Genen des gleichen Organismus
10 oder eines anderen Organismus in die DNA, oder einen Vektor erfolgen, oder in der Verstärkung der Aktivität bzw. Expression eines Gens durch Einbringen eines wirksameren Promotors, zum Beispiel aus CMV. Die Gene können für verschiedene Proteine kodieren, beispielsweise
15 für Proteine, wie Fusionsproteine oder für Antikörper.

Folgende Zelllinien können beispielhaft genannt werden: Säugerzellen, wie CHO Zelllinien, wie zum Beispiel
20 CHO-K1, BHK, wie BHK-21, Hybridoma, NS/0, andere Myelomazellen und Insektenzellen oder andere höhere Zellen. Besonders bevorzugt ist die Verwendung von Zellen, die nicht vorzugsweise wachstumsgekoppelt produzieren.

25 Eine rekombinante CHO Zelllinie deren Produktivität mit der erfindungsgemäßen Verfahrensweise gesteigert werden kann ist die Zelllinie CHO MUC1/IgG2a, PH 3744/25, mit der das Glykoprotein MUC1-IgG2a sekretiert werden kann.
30 Eine weitere CHO Zelllinie, nämlich CHO MUC2-GFP-C-term, ist befähigt ein Fusionsprotein MUC2-GFP-C-term gesteigert zu sekretieren, wenn sie der erfindungsgemäßen Verfahrensweise unterzogen wird.

Als Kulturmedium kann prinzipiell jedes glukosehaltige Medium eingesetzt werden, welches bezüglich anderer Komponenten nicht limitierend ist. Beispielfhaft kann ProCHO4-CDM genannt werden. Es können auch Medien basierend auf bekannten Rezepturen, wie zum Beispiel IMDM, DMEM oder Ham's F12 eingesetzt werden, die so auf die erfindungsgemäße Verfahrensweise optimiert wurden, daß lediglich Glukoselimitierung auftritt. Dies kann zum Beispiel dadurch erreicht werden, daß andere Komponenten im Verhältnis zur Glukose höher konzentriert werden. Generell ist es auch möglich die Glukose separat vom Medium zu dosieren.

Der PH Bereich liegt vorzugsweise zwischen 6,7 - 7,7, besonders bevorzugt zwischen 7 - 7,3. Jedoch sind auch andere pH-Bereiche denkbar.

Der Temperaturbereich liegt vorzugsweise zwischen 35 °C - 38,5 °C, besonders bevorzugt bei 37 °C für CHO MUC1- IgG2a. Es sind aber auch andere Temperaturbereiche denkbar, wie beispielsweise < 35 °C, bei denen es nicht zur irreversiblen Zerstörung des Produkts kommt.

Mit dem erfindungsgemäßen Kultivierungsverfahren können Substanzen, wie Glykoproteine, Fusionsproteine, Antikörper, Proteine im Allgemeinen produziert werden, von denen beispielhaft MUC1-IgG2a, MUC2-GFP-C-term, EPO, Interferone, Cytokine, Wachstumsfaktoren, Hormone, PA, Immunglobuline oder Fragmente von Immunglobulinen, genannt werden können.

Figur 1 zeigt den Verlauf der Lebendzellldichte (cv) an CHO/MUC1-IgG2a Zellen und der Mediendurchflußrate (D) gegen die Prozeßzeit (h) im Perfusionsreaktor. In ihr ist:

5

- Die Mediendurchflußrate (l/h) und
- die Lebendzellldichte (1/ml).

Figur 2 zeigt die spezifische Produktivität an MUC1-IgG2a (qMUC1-IgG2a) und DGL gegen die Prozeßzeit im Perfusionsreaktor. In ihr ist:

10

- Die spezifische Produktivität ($\mu\text{g/hE9}$ Zellen),
- DGL(degree of glucose limitation)

15

Figur 3 zeigt eine Graphik, in der auf der linken Seite die vitale Zellzahl [ml^{-1}] und auf der rechten Seite die Konzentration der Restglukose [mM] gegen die Prozeßzeit [h] für die Produktion von MUC1-IgG2 in CHO MUC/IgG2a PH3744/25 aufgetragen ist. In ihr ist:

20

- vitale Zellzahl und
- ◇ Glukose.

25

In Figur 4 ist die Glukose- und Laktatkonzentration sowie die Glukosekonzentration im Medienzulauf [mmol/l] gegen die Prozeßzeit [h] aufgetragen. In ihr sind die Kurven mit

30

- Laktatkonzentrationskurven und
- ◇ Glukosekonzentrationskurven.

$\times 23,9 \text{ mmol/l}$ Konzentration an Glukose im Medienzulauf
(Durchflußrate von $D = 0,035 \text{ h}^{-1}$).

5 In Figur 5 ist die Konzentration von MUC1-IgG2a [$\mu\text{g/ml}$]
auf der linken Seite sowie $q_{\text{MUC1-IgG2a}}$ [$\mu\text{g}/(\text{h} \cdot \text{E9 Zellen})$] auf der rechten Seite der Graphik gegen die Zeit
[h] aufgetragen. In ihr sind:

- 10 ● q spezifische Produktivität an MUC1-IgG2a
($\mu\text{g}/\text{hE9 Zellen}$) und
◇ Konzentration an MUC1-IgG2a (mg/l).

15 Figur 6 zeigt den Verlauf der Lebendzellldichte (cv) an
CHO/MUC2-GFP Zellen und der Mediendurchflußrate (D) ge-
gen die Prozeßzeit (h) im Perfusionsreaktor. In ihr
ist:

- 20 ■ Die Mediendurchflußrate ($1/\text{h}$) und
● die Lebendzellldichte ($1/\text{ml}$).

Figur 7 zeigt die spezifische Produktivität an
MUC2-GFP-C-term ($q_{\text{MUC2-GFP-C-term}}$) und DGL gegen die
Prozeßzeit im Perfusionsreaktor. In ihr ist:

- 25 ----- Die spezifische Produktivität ($\text{nmol}/\text{hE9 Zel-}$
len),
—— DGL (degree of glucose limitation)

30 Figur 8 zeigt eine Graphik, in der auf der linken Seite
die vitale Zellzahl [ml^{-1}] und auf der rechten Seite die
Konzentration der Restglukose [mM] gegen die Prozeßzeit
[h] für die Produktion von MUC2-GFP-C-term in

CHO MUC/IgG2a PH3744/25 aufgetragen ist. In ihr ist:

- vitale Zellzahl und
- ◇ Glukose.

5

In Figur 9 ist die Glukose- und Laktatkonzentration sowie die Glukosekonzentration im Medienzulauf [mmol/l] gegen die Prozeßzeit [h] aufgetragen. In ihr sind die Kurven mit

10

- Laktatkonzentrationskurven und
- ◇ Glukosekonzentrationskurven.

× 23,9mmol/l Konzentration an Glukose im Medienzulauf (Durchflußrate von $D = 0,035 \text{ h}^{-1}$).

15

In Figur 10 ist die Konzentration von MUC2-GFP-C-term [nM] auf der linken Seite sowie $q_{\text{MUC2-GFP-C-term}}$ [nmol/(h*E9 Zellen)] auf der rechten Seite der Graphik gegen die Zeit [h] aufgetragen. In ihr sind:

20

- q spezifische Produktivität an MUC2-GFP-C-term (nmol/hE9 Zellen) und
- ◇ Konzentration an MUC2-GFP-C-term (nM).

25

Figur 1 zeigt die erfindungsgemäße Verfahrensweise beispielhaft betreffend die Glukosezufütterung. In kontinuierlicher Perfusionsskultur wird eine konstante Menge Glukose zugefüttert. Im gezeigten Beispiel wird dies durch eine konstante Mediendurchflußrate erreicht, wobei die Glukosekonzentration im Medienzulauf konstant

30

ist. Die Mediendurchflußrate wird nicht mit zunehmender Lebendzell-dichte erhöht. Der Prozeß wurde als Batch begonnen, bevor die kontinuierliche Verfahrensweise begann.

5

Figur 2 zeigt, daß bei dieser Verfahrensweise der DGL im Verlaufe des Prozesses sinkt, und schließlich einen Wert unter 0,4 erreicht. Während dies geschieht, steigt die spezifische Produktivität an und erreicht schließlich einen Wert der um das 4-fache höher ist, als der vor Unterschreiten des DGL-Wertes von 0,4.

10

Aus Figur 3 wird ersichtlich, daß bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Lebendzell-dichte gegen einen Maximalwert läuft, der dann gehalten werden kann, während die Restglukosekonzentration im Verlauf gegen null geht. Dies tritt ein, obwohl Glukose zugeführt wird. Während des Absinkens der Restglukosekonzentration, beginnt die spezifische Glukoseaufnahme-rate der Organismen zu sinken. Während dessen kann die Lebendzellzahl noch ansteigen. Parallel zum Rückgang der spezifischen Glukoseaufnahme-rate sinkt auch die spezifische Laktatbildungsrate, was zunächst zu einem verlangsamten Anstieg, dann zu einem Abfall der Laktatkonzentration im Kulturgefäß führt. Schließlich läuft die Laktatkonzentration im Kulturgefäß gegen null, wie aus Figur 4 zu entnehmen ist. Es liegt also eine deutliche Umstellung des Zellmetabolismus vor. Wie Figur 5 zu entnehmen ist, findet verbunden mit der Umstellung des Zellmetabolismus ein Anstieg der spezifischen Produktivität auf etwa das 4-fache gegenüber dem Zeitpunkt vor der Umstellung des Zellmetabolismus statt. Der Anstieg der spezifischen Produktivität bei mindestens gleichblei-

15

20

25

30

benden, oder sogar noch ansteigenden Zelldichten während der beschriebenen Phase führt schließlich zu einem markanten Anstieg des Produkttiters im Kulturüberstand, wie Figur 5 zu entnehmen ist, und damit zu einer erhöhten Raum-/Zeit-Ausbeute.

Tabelle 1 zeigt Daten zur Fermentation von MUC1-IgG2a.

Analog zu den Figuren 1 bis 5 beschreiben Figuren 6 bis 10 die Ergebnisse der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens mit CHO MUC2-GFP-C-term Zellen.

Tabelle 2 zeigt Daten zur Fermentation von MUC2-GFP-C-term.

Produktionstechnisch kann das erfindungsgemäße Verfahren außer nach dem eben beschriebenen Perfusionsverfahren auch als Fed-Batch (Zufütterungsverfahren) betrieben werden.

In einem Fed-Batch-Betrieb wird die Produktionskultur einmal oder wiederkehrend, bzw. chargenweise oder kontinuierlich mit glukosehaltigem Medium oder einer separaten Glukoselösung in einer Art und Weise versorgt, daß der DGL vorzugsweise den Wert von 0,5, besonders bevorzugt 0,4 und noch besser 0,3 unterschreitet. Möglich ist hier auch ein repetitiver Fed-Batch.

Sowohl in der perfusiven Verfahrensweise als auch im Fed-Batch kann der Prozeß in allen allgemein bekannten Verfahrensweisen begonnen werden. So kann vor Beginn der erfindungsgemäßen Verfahrensweise die Kultur als Batch, Fed-Batch oder in kontinuierlicher Verfahrens-

weise mit oder auch ohne Zellrückhaltung betrieben werden.

Prozess-zeit	cv	D	Glu-kose Feed	Glukose	Laktat	MUC1-IgG2a	qMUC1-IgG2a	DGL
h	1/ml	1/h	mmol/l	mmol/l	mmol/l	µg/ml	µg/(h*E9)	
0	2,23E+05	0	0	22,07	2,5	2,62		
16,63	2,83E+05	0	0	20,89	5,1	3,59	0,21	0,92
40,52	6,48E+05	0	0	16,75	10,84	5,77	0,14	0,99
68	1,78E+06	0	0	8,74	20,1	14,21	0,17	0,61
94	2,14E+06	0,035	23,89	8,08	19,48	15,49	0,30	1,00
120	3,70E+06	0,035	23,89	5,84	22,35	18,02	0,22	0,72
136,5	4,68E+06	0,035	23,89	4,30	22,02	19,95	0,17	0,62
163,5	7,02E+06	0,035	23,89	3,17	22,66	22,67	0,14	0,40
187,5	6,96E+06	0,035	23,89	1,79	20,77	22,44	0,11	0,44
215,5	8,85E+06	0,035	23,89	1,04	17,46	28,24	0,13	0,35
264,75	1,30E+07	0,035	23,89	-	8,45	67,03	0,22	0,24
287	1,54E+07	0,035	23,89	-	5,25	89,42	0,22	0,20
310	1,84E+07	0,035	23,89	-	2,77	113,28	0,25	0,19
331	2,27E+07	0,035	23,89	-	1,24	133,80	0,24	0,14
352,4	1,45E+07	0,035	23,89	-	0,82	152,87	0,29	0,21
376,3	1,42E+07	0,035	23,89	-	0,53	182,52	0,45	0,22
404,4	1,58E+07	0,035	23,89	-	0,44	218,51	0,51	0,20
428	1,78E+07	0,035	23,89	-	0,58	241,75	0,50	0,17
448,4	2,08E+07	0,035	23,89	-	0,55	305,39	0,55	0,15
473,63	1,35E+07	0,035	23,89	-	0,55	290,52	0,60	0,23
496,8	9,30E+06	0,035	23,89	-	0,51	274,94	0,85	0,33
521,82	1,53E+07	0,035	23,89	-	0,56	301,12	0,87	0,20

Tabelle 1:
Daten zur Fermentation von MUC1-IgG2a

Prozeßzeit	Vitale Zellzahl	D	Glukose Feed	Glukose	Laktat	MUC2-GFP -Cterm	qProdukt	DGL
h	1/ml	1/h	mmol/l	mmol/l	mmol/l	nM	nmol/(h*E9)	
0,5	7,50E+04	0	0	21,37	3,12	0,00		
106	1,80E+06	0	0	4,25	21,1	1,66	0,01	0,44
106,01		0,035	23,89			8,92		
130	2,20E+06	0,035	23,89	9,36		7,71	0,14	0,66
154	2,90E+06	0,035	23,89	8,32	18,23	10,72	0,05	1,00
182,38	6,83E+06	0,035	23,89	5,58	19,28	14,08	0,17	0,53
212,9	1,19E+07	0,035	23,89	1,65	18,78	26,15	0,12	0,33
237,2	1,44E+07	0,035	23,89	0,54	13,84	38,37	0,11	0,26
254	1,48E+07	0,035	23,89	0,52	9,81	50,08	0,13	0,24
278	1,20E+07	0,035	23,89	-	5,19	65,63	0,20	0,35
302	1,40E+07	0,035	23,89	-	2,05	81,53	0,27	0,29
326	1,20E+07	0,035	23,89	-	0,7	88,03	0,30	0,34
349,9	2,16E+07	0,035	23,89	-	0,33	104,60	0,28	0,19
374	1,20E+07	0,035	23,89	-	0,26	104,03	0,28	0,34
		0,035	23,89	-		84,47		
		0,035	23,89	-		75,16		
446	1,10E+07	0,035	23,89	-	0,19	64,81		0,37
470	1,10E+07	0,035	23,89	-	0,53	52,36		0,37
494	1,40E+07	0,035	23,89	-	0,32	69,63	0,24	0,29
518	1,30E+07	0,035	23,89	-		79,34	0,26	0,32
		0,035	23,89	-		93,94		
		0,035	23,89	-	0,35	104,57		
595,8	1,01E+07	0,035	23,89	-	0,25	113,89		

Tabelle 2:
Daten zur Fermentation von MUC2-GFP-Cterm

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Verfahren zur Kultivierung von Zellen zur Produktion von Substanzen,

dadurch gekennzeichnet,

5 daß eine Substanzen produzierende Zelle unter Glukoselimitierung (DGL) kultiviert wird, wobei der DGL ($DGL = q_{Glc}/q_{Glc_{max}}$ mit q_{Glc} = beobachtete momentane spezifische Glukoseverbrauchsrate und

10 $q_{Glc_{max}}$ = maximal für diese Zellen bekannten spezifischen Glukoseverbrauchsrate) größer als der DGL ist, welcher zur ausschließlichen Erhaltung

($DGL_{Erhaltung}$) der Zelle führt, und $\leq 0,5$ ist, wobei der $DGL_{Erhaltung} = q_{Glc_{Erhaltung}}/q_{Glc_{max}}$ ist ,mit

$q_{Glc_{Erhaltung}}$ = bei reinem Erhaltungsstoffwechsel

15 beobachtete spezifische Glukoseverbrauchsrate und $q_{Glc_{max}}$ = maximal für diese Zellen bekannten spezifischen Glukoseverbrauchsrate.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

20 dadurch gekennzeichnet,

daß die $DGL \leq 0,4$ oder $\leq 0,3$ ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

25 daß die Menge zugefütterter Glukose nicht größer als 50 % dessen ist, was die ohne Glukoselimitierung maximal erwartete Zellzahl maximal verbrauchen kann.

30 4. Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Menge zugefütterter Glukose nicht größer als 35 % dessen ist, was die ohne Glukoselimitierung maximal erwartete Zellzahl maximal verbrauchen kann.

5

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Komponente aus der Gruppe der Zelllinien
CHO, wie z. B. CHO-K1, BHK, wie z. B. BHK-21,
10 Hybridoma, Myelomazellen, wie z. B. NS/0, andere
Säugerzellen und Insektenzellen oder andere höhere
Zellen eingesetzt wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
15 dadurch gekennzeichnet,
daß die produzierten Substanzen Proteine oder Poly-
peptide sind.
7. Verfahren nach Anspruch 6,
20 dadurch gekennzeichnet,
daß die produzierten Substanzen Fusionsproteine,
MUC1-IgG2a, MUC2-GFP-C-term, EPO, Interferone,
Cytokine, Wachstumsfaktoren, Hormone, PA, Immunglo-
buline, Fragmente von Immunglobulinen oder andere
25 Glykoproteine sind.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein glukosehaltiges Medium eingesetzt wird,
30 welches bezüglich anderer Nährstoffkomponenten
nicht vor Eintreten der Glukoselimitierung limitie-
rend ist.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Glukose separat von anderen Substraten ge-
füttert wird.

5

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß es in einem pH-Bereich von 6,7 - 7,7 durchge-
führt wird.

10

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß es in einem Temperaturbereich bei dem es nicht
zur irreversiblen Zerstörung des Produkts kommt
durchgeführt wird.

15

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß es in kontinuierlicher Verfahrensweise mit zu-
mindest partieller Zellrückhaltung betrieben wird.


20


13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
daß es im Fed-Batch Verfahren durchgeführt wird.


25


14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
daß es als Batch gestartet und als Fed-Batch oder
kontinuierlicher Prozeß fortgeführt wird.


15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
daß es mit nicht wachstumsgekoppelt produzierenden
5 Zellen durchgeführt wird.


**Fig. 1**


**Fig. 2:**


**Fig. 3**


**Fig. 4**

**Fig. 5**

**Fig. 6**

**Fig. 7**

**Fig. 8**

**Fig. 9**




Fig. 10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/03693

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C12N5/06 C12P21/02 C12P21/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C12N C12P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS, EMBASE

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 93/22448 A (TEIJIN LIMITED) 11 November 1993 (1993-11-11) the whole document	1-15
A	US 2001/009767 A1 (OHMAN L. ET AL.) 26 July 2001 (2001-07-26) the whole document	1-15
A	US 4 657 863 A (MAXWELL P.C. ET AL.) 14 April 1987 (1987-04-14) the whole document	1-15

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 April 2004

Date of mailing of the international search report

28/04/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Moreau, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/03693

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9322448	A	11-11-1993	CA 2111561 A1 11-11-1993
		DE 69311873 D1 07-08-1997	
		DE 69311873 T2 12-02-1998	
		EP 0592692 A1 20-04-1994	
		WO 9322448 A1 11-11-1993	
		JP 8508875 T 24-09-1996	
		US 5443968 A 22-08-1995	
US 2001009767	A1	26-07-2001	AU 5148296 A 16-10-1996
		EP 0817837 A1 14-01-1998	
		US 6210966 B1 03-04-2001	
		WO 9630500 A1 03-10-1996	
US 4657863	A	14-04-1987	CA 1198071 A1 17-12-1985
		EP 0098750 A2 18-01-1984	
		JP 59021387 A 03-02-1984	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03693

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C12N5/06 C12P21/02 C12P21/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 C12N C12P

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS, EMBASE

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 93/22448 A (TEIJIN LIMITED) 11. November 1993 (1993-11-11) das ganze Dokument	1-15
A	US 2001/009767 A1 (OHMAN L. ET AL.) 26. Juli 2001 (2001-07-26) das ganze Dokument	1-15
A	US 4 657 863 A (MAXWELL P.C. ET AL.) 14. April 1987 (1987-04-14) das ganze Dokument	1-15

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

8. April 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

28/04/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Moreau, J

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03693

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9322448 A	11-11-1993	CA 2111561 A1	11-11-1993
		DE 69311873 D1	07-08-1997
		DE 69311873 T2	12-02-1998
		EP 0592692 A1	20-04-1994
		WO 9322448 A1	11-11-1993
		JP 8508875 T	24-09-1996
		US 5443968 A	22-08-1995
US 2001009767 A1	26-07-2001	AU 5148296 A	16-10-1996
		EP 0817837 A1	14-01-1998
		US 6210966 B1	03-04-2001
		WO 9630500 A1	03-10-1996
US 4657863 A	14-04-1987	CA 1198071 A1	17-12-1985
		EP 0098750 A2	18-01-1984
		JP 59021387 A	03-02-1984